



ГРИПП, ОРВИ


I. ПРОФИЛАКТИКА

Излучатели «1У» или «Зелёный».


1-й день: Gi 20 + Gi 4 + E 1

	<p>- воздействие на зону у носогубной складки (у крыльев носа) – слева (Gi 20)</p>
---	--

	<p>- воздействие на зону тыльной стороны кисти, в промежутке между I и II пястными костями – слева - (Gi4)</p>
--	--

	<p>- воздействие на зону у нижнего края глазницы - справа (E1)</p>
---	--


2-й день:



- воздействие на зону у носогубной складки (у крыльев носа) – справа (Gi20)





- воздействие на зону тыльной стороны кисти, в промежутке между I и II пястными костями – справа - (Gi4)




- воздействие на зону у нижнего края глазницы - слева (E1)


3-й день: Грудина + V 40

	<p>- воздействие на зону верхней трети грудины (VC 20)</p>
---	--


	<p>- воздействие на зону середины подколенной ямки – справа (V40)</p>
---	---


4-й день:

	<p>- воздействие на зону верхней трети грудины (VC 20)</p>
---	--


	<p>- воздействие на зону середины подколенной ямки – слева (V40)</p>
---	--


5-й день: E 2 + Rp 4

	<p>- воздействие на зону под глазницей - слева - (E2)</p>
---	---


	<p>- воздействие на зону, расположенную у внутреннего свода стопы – справа (Rp4)</p>
---	--

6-й день:


	<p>- воздействие на зону под глазницей - справа - (E2)</p>
---	--

	<p>- воздействие на зону, расположенную у внутреннего свода стопы – слева (Rp4)</p>
---	---

Если в окружении имеется человек, уже заболевший вирусной инфекцией, можно «снимать» у него информацию с зоны у носогубной складки (у крыльев носа) и «переносить» её на воду. Эту воду (несколько глотков) надлежит выпить сразу же.




Кроме того, рекомендовано воздействие с первого дня в фоновом режиме на зону у внутреннего свода стопы, чередуя через день лево-право (Rp 4).



II. ЛЕЧЕНИЕ

Излучатели «1У» или «Зелёный».


1-й день: E 2 + Rp 4





- воздействие на зону, расположенную у внутреннего свода стопы – справа (Rp4)

2-й день:




- воздействие на зону под глазницей - справа - (E2)



- воздействие на зону, расположенную у внутреннего свода стопы – слева (Rp4)

3-й день: Грудина + V 40




- воздействие на зону верхней трети грудины (VC 20)



- воздействие на зону середины подколенной ямки – слева (V40)

4-й день:




- воздействие на зону верхней трети грудины (VC 20)




- воздействие на зону середины подколенной ямки – справа (V40)

5-й день: Gi 20 + Gi 4




- воздействие на зону у носогубной складки (у крыльев носа) – слева (Gi20)




- воздействие на зону тыльной стороны кисти, в промежутке между I и II пястными костями – справа - (Gi4)

6-й день:






- воздействие на зону у носогубной складки (у крыльев носа) – справа (Gi20)




- воздействие на зону тыльной стороны кисти, в промежутке между I и II пястными костями – слева - (Gi4)

С первого же дня – воздействие на следующие зоны в фоновом режиме (чередую зоны и стороны) – козелок, VB16, грудина, E2, VG14, Rp4:





- воздействие на зону между VII шейным и I грудным позвонками (VG 14)



- воздействие на зону верхней трети грудины (VC 20)



- воздействие на зону, расположенную у внутреннего свода стопы – (Rp4)

Кроме того, и в случае профилактики, и в случае лечения рекомендовано:

1. «Снимать» информацию со среза дольки чеснока (15 сек.) любым излучателем (кроме инфракрасного) и «переносить» её на воду (1 мин.), на зону внутреннего свода стопы (15 мин.) и на зону пульса (чередовать) – 2-4 раза в день.



- воздействие на зону пульса – справа - (P7)




- воздействие на зону, расположенную у внутреннего свода стопы – (Rp4)

2. Чередовать с воздействием на систему соответствия по Су Джок в фоновом режиме -1-я фаланга I пальца на ладонной поверхности (чередовать через день лево-право).



3. Также можно «снимать» информацию с иммуномодулирующих, противовирусных средств и «переносить» её на зону у носогубной складки (у крыльев носа).



зона у носогубной складки (у крыльев носа)
(Gi20)